

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култури за които е разрешен за употреба; Вредители: фумигант срещу складови неприятел: житна гърица (*Sitophilus granarius*), оризова гърица (*Sitophilus oryzae*), зърнов бръмбар (*Rhizopertha dominica*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*)

Разрешена доза (концентрация) за употреба: 30 дражета/тон зърно

Моменти на приложение: -

Особености на приложението: експозиция: 3 денонощия при температура над 12° C; 4 денонощия при t° 5-12° C; 15 денонощия при t° под 5° C.

Количество на работния разтвор: -

ТОКСИКОЛОГИЯ:

Категория за употреба: I-па

Карантинен срок: за зърно - 30-45 дни; за брашно - 60 дни

Опаковка, маркировка:

Символи на опасност: силно токсичен-T+; силно запалим-F; вреден-Xn

Фрази на риска: R: 15/29; 26/28; 22; 32.

Особени изисквания и/или ограничения: прилага се от квалифициран технолог обгазител

Фрази за безопасност: S: 1; 2; 3/9/49; 7/8; 13; 20/21; 22; 30; 43; 45

Разрешителното важи до: 28.12.2012 г.

ГЕН. ДИРЕКТОР



Пл. Лазаров