

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култури за които е разрешен за употреба: за фумигация на складирани стоки, брашно в чували, фъстъци, билки, пютюн

Вредители: оризова (*Sitophilus oryzae*) и житна (*Sitophilus granarius*) гъгрица, ръждивочервен брашмян бръмбар (*Tribolium castaneum*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*)

Разрешена доза (концентрация) за употреба: 1 плоча на 25 куб.м.

Моменти на приложение:

Особености на приложението: Експозиция 3 денонощия при $t\ 25^{\circ}\text{C}$; 12 денонощия при t под 25°C

Количество на работния разтвор:

ТОКСИКОЛОГИЯ:

Категория за употреба: I-ва

Карантинен срок: за зърно - 30 дни; за брашно - 60 дни

Опаковка, маркировка:

Символи на опасност: токсичен - T; запалим - O

Фрази на риска: отделя силно токсичен газ, който дори в малки концентрации може да предизвика смърт

Особени изисквания и/или ограничения: отделя газ - силно токсичен за всякакви живи организми, но при правилна употреба не позволява практически контакт

Фрази за безопасност: прилага се от специално обучени професионалисти

Разрешителното важи до: 19.12.2013 г.



ГЕН. ДИРЕКТОР:

/д-р П. Николов/