



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01827 – ПРЗ*

Дата на издаване: 06.03.2020г.

Издание: 1/06.03.2020г.

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА

Активно/и вещество/а:

алуминиев фосфид 560 г/кг

Производител/и:

Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Производител: Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Функция на продукта: инсектицид

Вид на формулацията: продукт отделящ газ (ГЕ)

Категория за употреба: първа професионална

**Размер и материал на
опаковката:**

алуминиеви бутилки от 120 мл, 320 мл и 1200 мл,
съдържащи 90 г, 100 г, 250 г и 1000 г продукт. Теглото
на 1 пелета е 0,6 г.

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:** Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-578/26.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.08.2023 г.

При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта
 Формулация
 Концентрация на активно/и алуминиев фосфид 560 г/кг
 вещество/а:

№	Култура и/или описание	Π О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между Прило жения та (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка грама а.в./дка		
1	При съхранение на - продукти от зърнено- житни култури, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, складирани маслодайни семена, ядки, преработени ядливи продукти, сушени подправки, чай, кафе, какао, рождков и сушени билки	3	Житна гърица (<i>Strophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Strophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides</i> <i>obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus</i> <i>pisorum</i>) царевична гърица (<i>Strophilus</i> <i>zeatais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	25-50 пелети/м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	-	Преработени продукти от зърно-14 дни; ядки-21 дни; шам-фъстък- 35 дни; всички останали*-7 дни	Между 5-14 дневна експозиция
2	Тютюн при съхранение	3	зърнов	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	25-50 пелети/м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	-	-	Между 5-14 дневна експозиция

3	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи	3	бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), потонев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), потонев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочерв ен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнени бръмбари (<i>Tenebrio</i> sp.), брашнен акар (<i>Ascaris siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus</i> sp	Фумигация в затворени пространства	Преди складиране	1	-	25-50 пелети /м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	-	-	Между 5-14 дневна експозиция
4	Зърно при транзитен корабен транспорт	3	бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), потонев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), потонев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочерв ен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнени бръмбари (<i>Tenebrio</i> sp.), брашнен акар (<i>Ascaris siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus</i> sp	Фумигация в затворени пространства	По време на транспорт	1	-	25-50 пелети /м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	-	-	21 дневна експозиция

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. халещи/гризеши или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Кодове – GIFAР Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на рела, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCN Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се samozапалят, категория 1	H260 H300 H311 H315 H318	GHS02 GHS05 GHS06 GHS09 Опасно	H260 H300 H311 H318 H330	EUN029 EUN032 EUN401 EUN070	SP1 Spo 1
Остра токсичност, орална, категория 2	H330		H400		
Остра токсичност, дермална, категория 3	H400				
Дразнене на кожата Категория 2					
Остра токсичност, инхалаторна, категория 2					
Сериозно увреждане на очите, категория 1					
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1					

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло (гащеризон) и оборудване за защита на дихателните пътища (полумаска най-малко EN 140 с комбиниран филтър най-малко EN14387 B2P3 или еквивалентен) при прилагане и повторно влизане в третираните зони преди концентрацията във въздуха на фосфин да е под 0,01 ppm Срок на повторно влизане в третираните зони – след проветряване в продължение на 48 часа и концентрацията на фосфин във въздуха под 0,01 ppm При контакт с кожата, първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода. Да се прилага само от лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ

На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.